



## **Comportement après la chirurgie et les extractions dentaires**

1. Ils ne mangent quelque chose si l'anesthésique a disparu. Ils pourraient autrement passer inaperçus dans la joue ou la lèvre mordre ou de brûlure.
2. Rincer après avoir mangé ou après le brossage, avec un rince-bouche pendant une minute.
3. Si vous voulez éviter tout contact avec les plaies. Lèche presser et ne pas sucer la plaie guérit le mieux celui qui vous pouvez être qui vous le temps et le repos.
4. Évitez le café, le thé noir, les cigarettes, alcool et drogues la chaleur et l'effort physique.
5. Ne pas manger dans les premiers jours après l'intervention sans produits laitiers ( la guérison bactéries retardent la plaie) et pas d'aliments de marche forte. Jus de fruit fraîchement pressés ainsi que des granulés.
6. Ne pas fumer retards à la nicotine de la cicatrisation des plaies.
7. Refroidir les lots concernés, les deux premiers jours après la procédure le poser sur un sac isotherme non pas directement sur la peau mais lui envelopper d'un linge afin que la joue n'est pas refroidie trop. Laisser refroidir 20 minutes et on met le vin nouveau dans une pause.
8. Ils sont debout que possible après l'intervention quand ils se couchent pour dormir sur le côté possible qui ne fonctionnait pas.
9. Une légère hémorragie pendant 1-2 jours c'est normal. Une goutte de sang mélangé à la salive apparaît comme une bouche pleine de sang ils n'ont pas peur moi dans les cas douteux immédiatement par contact téléphonique le contrôle c'est mieux que guérir.
10. Douleur et le gonflement peut être jusqu'à les troisièmes jours après l'opération pour être plus fort. Ceci est normal. A partir des 4 jours devrait être en baisse ce n'est pas le cas ils appellent à mordre immédiatement.

Notre équipe souhaite un prompt rétablissement.